Département de la Haute-Savoie (74)
Ville de Publier

Plan Local d'Urbanisme

Règlement écrit

Annexe 2 :

Guide Communal des Essences Végétales Locales

APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES ZONES A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET URBAINES

Publier
Amphion

Version arrêtée le 26/05/2025 et approuvée le 19/01/2026

Table des matières

Préambule 4

Essences arborescentes recommandées 7

Essences arborescentes recommandées 15

Essences arbustives recommandées 25

Essences grimpantes et rampantes recommandées 34

Essences végétales exotiques invasives 37

Préambule

Préambule

L'objectif du présent Guide Communal des Essences Végétales Locales, annexé au Règlement Écrit du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Publier, est d'orienter et d'assister les choix des porteurs de projets tant particuliers que professionnels quant à la flore adéquate à sélectionner dans le cadre d'aménagements paysagers.

En premier lieu, ce listing a été fondé d'après les conseils du Service des Espaces Verts de la mairie. En second lieu, il a été enrichi par les renseignements collectés par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), dorénavant renommée France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes, fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement.

En outre l'intérêt esthétique (espèce végétale ornementale), les espèces végétales suggérées dans ce livret recèlent des avantages indéniables pour la préservation de la biodiversité (flore et faune) ainsi que pour la production et la consommation alimentaire humaine.

Toutefois, il est vivement recommandé de vérifier le potentiel allergène (notamment cutanée et respiratoire) de chaque proposition et le potentiel toxique (notamment cutané et digestif) de chaque suggestion avant de choisir les espèces et leurs emplacements au sein de la propriété privée.

Selon le site internet officiel du Ministère de la Santé et de la Prévention, plusieurs essences végétales suggérées au sein de cette liste possèdent un potentiel allergène respiratoire conséquent (allergie au pollen). C'est pourquoi, se fondant sur ces données et l'arrêté ministériel n°SSAP2009553A du 04/09/2020 et l'arrêté préfectoral n°ARS/DD74/ES/2019-29, le marqueur ci-après a été indiqué pour chaque espèce végétale concernée : **POTENTIEL ALLERGÈNE ÉLEVÉ**. Concernant ces espèces végétales au potentiel allergène élevé, il est donc demandé aux porteurs de projet de les planter uniquement dans les zones agricoles et naturelles, éloignées des zones d'activités et d'habitation urbaines.

<u>Ce guide a été conçu selon 5 axes de réflexion :</u>

- Le premier tableau expose les essences d'arbres dits à grand développement, soit ceux d'une hauteur comprise entre 7 et 20 mètres à l'âge adulte,
- Le deuxième tableau présente les essences d'arbres dits à petit développement, soit ceux d'une hauteur comprise entre 2 et 7 mètres à l'âge adulte,
- Le troisième tableau inventorie les essences d'arbustes pertinentes afin de planter des haies vives et locales en clôture, soit ceux d'une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres à l'âge adulte,
- Le quatrième tableau recense les essences de plantes grimpantes / rampantes,
- Le cinquième tableau référence les essences végétales exotiques invasives.

Les genres et variétés de végétaux sont classés par ordre alphabétique dans chaque tableau.

Au regard de l'évolution constante des croisements en botanique et en horticulture, les familles, les genres ainsi que les variétés de chacune des espèces végétales arborescentes, arbustives et grimpantes / rampantes listées au sein des tableaux de présentation ci-dessous ne sont pas exhaustives. D'autres espèces et sous-espèces pourront être proposées en dehors de celles spécifiées ci-après (notamment les nombreux cultivars existants et futurs), aux conditions que le porteur de projet s'assure au préalable que :

- Les besoins nécessaires à la santé et à la pérennité de la plante peuvent être satisfaits (dimensions, ampleurs, croissance, luminosité, composition des sols et caractéristiques climatiques…) ;
- Les origines de la famille, du genre et de l'espèce végétale choisie sont par principe indigènes ou du moins, non-invasives.

Il est fortement recommandé de solliciter les conseils d'un pépiniériste ou d'une jardinerie avant d'effectuer toute commande.

À titre informatif, la liste des espèces végétales protégées au sein du Département de la Haute-Savoie est proposée sur le site internet officiel de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) – en vertu de l'arrêté du 04/12/1990, complétant la liste nationale des espèces animales et végétales protégées au titre de l'arrêté du 20/01/1982.

Lexique

Notions et termes classés par ordre alphabétique

Caduc / Marescent / Persistant :

Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage caduc lorsque les feuilles émergent au printemps et tombent en automne ; en opposition au feuillage persistant.
Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage marcescent lorsque les feuilles flétries subsistent jusqu'à la fin de la saison hivernale.
Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage persistant lorsque les feuilles subsistent tout le long de l'année ; en opposition au feuillage caduc.

Cultivar :

Cette notion désigne une variété artificielle obtenue par hybridation, sélection ou mutation d'une espèce végétale, afin d'être cultivée.

Espèce / Famille / Genre :

En botanique et en horticulture, les espèces végétales sont classées via 3 échelons dégressifs selon leurs caractéristiques (gènes et traits) communes : famille, genre et variété.

- Famille : est précisé par le suffixe « *-acées* » en français et « *-eae* » en latin / en exemple : *Rosacée* ou *Rosaceae* ;
- Genre : est désigné par le second mot dont la première lettre est écrite en majuscule / en exemple : *Spirée* ou *Spiraea* ;
- Variété : est indiqué par le troisième terme rédigé uniquement en minuscule / en exemple : *dentelée* ou *arguta* ;

Soit en exemple : *Rosaceae Spiraea arguta* ou *Rosacée Spirée dentelée*.

Exotique / Indigène :

Une espèce végétale est considérée comme étant exotique lorsqu'elle pousse, avec ou sans intentions ou interventions humaines, dans un territoire donné qui n'est pas celui d'origine.
Une espèce végétale est considérée comme étant indigène lorsqu'elle croît naturellement dans un espace donné, sans aucune intention ou intervention de l'homme.

Intérêt :

- Alimentaire : désigne les espèces végétales dont la production de baies, de fleurs, de fruits et de graines permet de nourrir tant la faune que les hommes.
- Faunistique : désigne les espèces végétales produisant des graines, des fruits et des baies nourrissant les animaux, dont surtout la petite faune. Cette nourriture est souvent impropre à la consommation humaine (digestion difficile voire intoxication). L'intérêt faunistique peut également indiquer un intérêt d'habitat pour les oiseaux, les insectes et les rongeurs ou encore, par la visite des insectes pollinisateurs afin d'assurer la reproduction des espèces végétales endémiques.
- Mellifère / nectarifère : désigne les espèces végétales performantes dans la production de nectar et de pollen, accessibles par les insectes pollinisateurs et mellifères.

Pondus Hydrogenium (Ph) :

Il s'agit de l'unité de mesure permettant d'identifier le taux d'acidité (de 0 à 6,99) ou d'alcalinité (de 7,01 à 14) d'un liquide ; la neutralité étant identifiée à 7 sur une échelle de 14.

Essences arborescentes recommandées

ARBRES DITS DE GRAND DEVELOPPEMENT

ESSENCES ARBORESCENTES RECOMMANDEES

ARBRES DITS DE GRAND DEVELOPPEMENT / HAUTEUR A L'AGE ADULTE COMPRISE ENTRE 5 ET 30 METRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTERISTIQUES		PHOTOGRAPHIES
	Esthétiques	Climatiques	
Aulne blanc *Betulaceae* *Alnus incana* **INTERET MELLIFERE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : haie ou isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert gris - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -40° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin	
Aulne glutineux *Betulaceae* *Alnus glutinosa* **INTERET MELLIFERE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 25 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : de -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	
Bouleau blanc *Betulaceae* *Betula alba* **INTERET MELLIFERE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	
Bouleau pubescent *Betulaceae* *Betula pubescens* **INTERET MELLIFERE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -9° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux, caillouteux, sableux, tourbeux - Humidité : sol très sec à très humide - Ph : acide à alcalin	

Cèdre de l'Atlas *Pinaceae* *Cedrus atlantica* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 20 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert gris à vert bleu - Floraison : /	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Cèdre du Liban *Pinaceae* *Cedrus libani* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : modérée - Maturité : 50 mètres de hauteur, 20 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : /	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Charme commun *Betulaceae* *Carpinus betulus* **INTERET MELLIFERE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : haie ou isolé - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : printemps / fleur verte	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragé - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Châtaignier commun *Fagaceae* *Castanea sativa* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : modérée - Maturité : 20 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit marron	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide		

Chêne pédonculé *Fagaceae* *Quercus robur* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 10 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur brune / fruit brun	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Chêne pubescent *Fagaceae* *Quercus pubescens* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 15 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur brune / fruit brun	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Chêne rouvre *Fagaceae* *Quercus petraea* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 30 mètres de hauteur, 18 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit brun	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, sableux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à neutre		
Liquidambar *Hamamelidaceae* *Liquidambar styraciflua* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps/ fleur brune / fruit brun	- Rusticité : de -20 à -25° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre		

Épicéa commun *Pineaceae* *Picea abies* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 35 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : /	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre		
Érable champêtre *Sapindaceae* *Acer campestris* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : de -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol humide - Ph : neutre à alcalin		
Érable de Freeman *Sapindaceae* *Acer x freemanii* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 15 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / verte à rouge - Floraison : printemps / fleur rouge	- Rusticité : - 34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre		
Hêtre commun *Fagaceae* *Fagus sylvatica* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 20 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		

Laurier-tulipe ou Magnolia à grandes fleurs *Magnoiliaceae* *Magnolia grandiflora*	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 10 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux, sableux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Noyer commun *Juglandaceae* *Juglans regia* **INTERET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit marron	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin		
Peuplier tremble *Salicaceae* *Populus tremula* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire argilo-limoneux, - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin		
Pin des Alpes *Pinaceae* *Pinus cembra* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : tous les types de sol - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre		

Pin noir *Pinaceae* *Pinus nigra* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 30 mètres de hauteur, 7 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert gris à vert bleu - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : tous les types de sol - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre		
Pin sylvestre *Pinaceae* *Pinus sylvestris* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : lente - Maturité : de 20 à 25 mètres - Feuillage : persistant / vert bleu ou vert gris - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -30° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à sec - Ph : acide à neutre		
Saule blanc *Salicaceae* *Salix alba* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, largeur 20 mètres - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à alcalin		
Tilleul à grandes feuilles *Tiliaceae* *Tilia platyphyllos* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 35 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : été / fleur jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		

Tilleul à petites feuilles *Tiliaceae* *Tilia cordata* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 25 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : été / fleur jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, glaiseux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	

Essences arborescentes recommandées

ARBRES DITS DE PETIT DEVELOPPEMENT

ESSENCES ARBORESCENTES RECOMMANDEES

ARBRES DITS DE PETIT DEVELOPPEMENT / HAUTEUR A L'AGE ADULTE COMPRISE ENTRE 2 ET 7 METRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTERISTIQUES		PHOTOGRAPHIES
	Esthétiques	Climatiques	
Gainier silicastre *Fabaceae* *Cercis siliquastrum* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : lente - Maturité : 10 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à vert bleu - Floraison : printemps / fleur rose à violet / fruit rouge	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec - Ph : acide à basique	
Arbre à perruques *Anacardiaceae* *Cotinus coggygria* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 3 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert ou rouge - Floraison : été / fleur blanc à rose	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à basique	
Abricotier commun *Rosaceae* *Prunus armeniaca* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à orangé - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit orange	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin	
Aubépine monogyne *Rosaceae* *Crateagus monogyna* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	

Aubépine épineuse *Rosaceae* *Crataegus oxyacantha* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Cityse des Alpes *Fabaceae* *Laburnum alpinum*	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Cerisier commun *Rosaceae* *Prunus avium* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 5 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		
Cerisier du Japon *Rosaceae* *Prunus serrulata* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		

Cornouiller mâle *Cornaceae* *Cornus mas* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Cornouiller sanguin *Cornaceae* *Cornus sanguinea* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		
Cyprès commun de Leyland *Cupressus cyparis leylandii* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : haie - Croissance : rapide - Maturité : 7 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Éléagne à étroites feuilles *Elaeagnaceae* *Elaeagnus angustifolia* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 3 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : automne / fleur blanche à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		

Érable du Japon *Sapindaceae* *Acer palmatum /* *Acer japonicum* **INTERET MELLIFERE**	Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre		
Fusain d'Europe *Celastraceae* *Euonymus europaeus* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur verte/ fruit rose à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
If commun *Taxus baccata* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 3 mètres de hauteur, 1 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol sec à humide - Ph : alcalin		
Lilas des Indes *Lythraceae* *Lagerstroemia Indica* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : été / fleur rose, violette, rouge	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à neutre		

Magnolia de Soulange *Magnoliaceae* *Magnolia x Soulangeana*	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre	
Mûrier blanc *Moraceae* *Morus alba* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : massif ou isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit blanc à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre	
Mûrier noir *Moraceae* *Morus nigra* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : massif ou isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 13 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit noir	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre	
Noisetier commun *Betulaceae* *Coryllus avellana* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE** **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit marron	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin	

Pêcher commun *Rosaceae* *Prunus persica* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : lente - Maturité : 5 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps et été / fleur rose / fruit orange	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre		
Poirier commun *Rosaceae* *Pyrus communis* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit jaune	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à neutre		
Pommier commun *Rosaceae* *Malus domestica* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit vert à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Pommier d'ornement *Rosaceae* *Malus perpetu* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit jaune à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		

Pommier sauvage *Rosaceae* *Malus sylvestris* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit vert à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Prunellier commun *Rosaceae* *Prunus spinosa* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 3,5 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit bleu à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Prunier commun *Rosaceae* *Prunus domestica* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit vert à violet	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : humide - Ph : neutre		
Saule marsault *Salicaceae* *Salix caprea* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert gris - Floraison : printemps / fleur grise à vert	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol très sec à très humide - Ph : acide à alcalin		

Saule pourpre *Salicaceae* *Salix purpurea* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / verte gris bleue - Floraison : printemps / fleur verte / fruit blanc	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin		
Saule des vanniers *Salicaceae* *Salix viminalis* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur verte	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol humide à très humide - Ph : acide à alcalin		
Sorbier des oiseaux *Rosaceae* *Sorbus aucuparia* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit orange	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Sureau noir *Adoxaceae* *Sambucus nigra* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 3,5 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin		

Tamaris commun *Tamaricaceae* *Tamarix gallica*	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Tamaris de printemps *Tamaricaceae* *Tamarix parviflora*	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 4,5 mètres de hauteur, 4,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Troène commun *Oleaceae* *Ligustrum vulgare* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin		

Essences arbustives recommandées

ESSENCES ARBUSTIVES RECOMMANDEES

HAUTEUR A L'AGE ADULTE COMPRISE ENTRE 1 ET 2 MÈTRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTERISTIQUES		PHOTOGRAPHIES
	Esthétiques	Climatiques	
Abélie à grandes fleurs *Caprifoliaceae* *Abelia x grandiflora* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : été / fleur blanche à mauve	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	
Hibiscus commun *Malvaceae* *Hibiscus syriacus* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 2 mètres de hauteur, 1,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à violet	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin	
Aucuba du Japon *Cornaceae* *Aucuba japonicum*	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur pourpre / fruit rouge	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	
Kolkwitzia *Caprifoliaceae* *Linnaea amabilis*	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	

Cassissier *Grossulariaceae* *Ribes nigrum* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur vert / fruit noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		
Cornouiller blanc *Cornaceae* *Cornus alba* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche à jaune / fruit blanc à bleu	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Cornouiller à bois jaune *Cornaceae* *Cornus stolonifera flaviramea* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -40° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Cotonéaster de Franchet *Rosaceae* *Cotoneastere franchetti* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		

Cotonéaster laiteux *Rosaceae* *Cotoneastere lacteus* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Églantier *Rosaceae* *Rosa canina* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Cynorrhodon *Rosaceae* *Rosa rubiginosa* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Deutzie effilé *Hydrangeaceae* *Deutzia gracilis* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		

Deutzie crénelé *Hydrangeaceae* *Deutzia crenata* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Éléagne à grandes feuilles *Elaeagnaceae* *Elaeagnus ebbingei* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : automne / fleur blanche à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Mimosa de Paris *Oleaceae* *Forsythia* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		
Framboisier commun *Rosaceae* *Rubus idaeus* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur jaune / fruit rose	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à alcalin		

Groseillier commun *Grossulariaceae* *Ribes vulgare* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à neutre		
Houx crénelé *Aquifoliaceae* *Ilex crenata* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit noir	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à neutre		
Houx commun *Aquifoliaceae* *Ilex aquifolium* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Seringat commun *Hydrangeaceae* *Philadelphus coronarius* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		

Laurier cerise *Rosaceae* *Prunus laurocerasus* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, caillouteux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre		
Lilas de Californie *Rhamnaceae* *Ceanothus* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur bleue	- Rusticité : -10° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec - Ph : acide à alcalin		
Myrtillier commun *Ericaceae* *Vaccinium myrtillus* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE**	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit bleu	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide		
Potentille arbustive *Rosaceae* *Dasiphora fruticosa*	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : alcalin		

Potentille blanche *Rosaceae* *Potentilla alba* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 0,5 mètre de hauteur, 0,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin		
Oranger du Mexique *Rutaceae* *Choisya ternata* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre		
Cerisier de Nankin *Rosaceae* *Prunus tomentosa* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais - Ph : acide à neutre		
Spirée du Japon *Rosaceae* *Spiraea japonicum* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur rose à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		

Spirée de Van Houtte *Rosaceae* *Spiraea x vanhouttei* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Troène doré *Oleaceae* *Ligustrum ovalifolium aureum* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Viorne lantane *Virburnum lantana* **INTERET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Weigélie fleurie *Caprifoliaceae* *Weigela florida* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur rose à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin		

Essences grimpantes et rampantes recommandées

ESSENCES GRIMPANTES / RAMPANTES RECOMMANDEES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTERISTIQUES		PHOTOGRAPHIES
	Esthétiques	Climatiques	
Chèvrefeuille des bois *Caprifoliaceae* *Lonicera xylosteum* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche à jaune / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	
Chèvrefeuille des haies *Caprifoliaceae* *Lonicera peryclimenum* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur jaune à rose	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	
Clématite vigne-blanche *Ranunculaceae* *Clematis vitalba* **INTERET MELLIFERE ET FAUNISTIQUE**	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	
Glycine grimpante *Fabaceae* *Wisteria sinensis* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou support - Croissance : rapide - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur violette	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre	

Lierre grimpant *Araliaceae* *Hedera helix* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur verte / fruit bleu à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin		
Passiflore bleue *Passifloraceae* *Passiflora caerulea* **INTERET MELLIFERE**	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche et bleue	- Rusticité : -10° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide		

Essences végétales exotiques invasives

ESSENCES VEGETALES EXOTIQUES INVASIVES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	NUISANCES	PHOTOGRAPHIES
ESPECES ARBOREES		
Ailante *Simaroubaceae* *Ailanthus altissima*	**Phénomène :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques	
Érable negundo *Sapindaceae* *Acer negundo*	**Phénomène :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques Dégradation des forêts alluviales	
Robinier faux acacia *Fabaceae* *Robinia pseudo-acacia*	**Phénomènes :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Augmentation de l'apport en azote dans les sols alentours **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques	

ESPECES ARBUSTIVES			
Ambroisie *Asteraceae* *Ambrosia artemisiifolia* *(et tout autre variété)* **POTENTIEL ALLERGENE ELEVE**	**Phénomène :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques Risque allergène extrêmement conséquent		
Arbre aux papillons *Scrophulariaceae* *Buddleja davidii*	**Phénomène :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultat :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		
Bambous de jardin *Poaceae* *Bambusoideae fargesia*	**Phénomènes :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		
Faux indigo *Fabaceae* *Amorpha fruticosa*	**Phénomènes :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Augmentation de l'apport en azote dans les sols alentours **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		

Sumac de Virginie *Anacardiaceae* *Rhus typhina*	**Phénomènes :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Présence d'éléments allergènes **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques Éléments allergènes cutanés provoquant des dermatoses		
ESPECES GRIMPANTES / RAMPANTES			
Vigne vierge *Vitaceae* *Parthenocissus inserta*	**Phénomène :** Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement **Résultats :** Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		

Publier
Amphion